

Estação de Avisos do Douro

Circular nº 03/2011

Régua, 11 de Abril de 2011

ENXOFRE AO PÂMPANO

Aconselhamos os Srs. Viticultores a efectuarem uma aplicação de enxofre quando as videiras apresentarem pâmpanos com cerca de 20 a 30 cm.

Este tratamento destina-se a proteger a videira contra o oídio e outras doenças, bem como, aproveitando o efeito repulsivo do enxofre, prevenir o aparecimento de algumas pragas.

Importante:

- ✓ Recomendamos que não sejam aplicadas doses excessivas de enxofre. Nesta fase, a dose de referência é de 20 a 25 kg/ha de enxofre em pó e de 8 a 10 kg/ha de enxofre molhável.
- ✓ O enxofre em pó deverá ser aplicado com **polvilhador** ou **torpilha**, para que o produto fique depositado sob a forma de uma fina camada à **superfície das folhas da videira**, evitando a sua escorrência para o solo. As aplicações de enxofre em pó devem ser realizadas com a folhagem seca para evitar problemas de fitotoxicidade (queima).

Atenção Sr. Viticultor:

O enxofre em pó deve ser aplicado com **polvilhador** ou **torpilha**. A utilização do “saco” para aplicar enxofre conduz a um gasto exagerado de produto que é nefasto para o solo (aumento da acidez), para o ambiente e para a “bolsa” do agricultor.


Evite o desperdício! Não aplique enxofre com “saco”!

ATENÇÃO Sr. Agricultor!

Dada a obrigatoriedade de formação específica no âmbito da aplicação de produtos fitofarmacêuticos para todos os agricultores e aplicadores profissionais, informa-se que deverão inscrever-se junto das entidades, reconhecidas pela DRAPN, que estão a promover esta formação. Para mais informação, contactar:

Eng. Teotónio Castro, Tel.: 259300600 - Vila Real e-mail: TeotonioCastro@drapn.min-agricultura.pt

O Responsável pela Estação de Avisos do Douro



José Rodrigues de Freitas
(Engenheiro Agrónomo)