

FUNGICIDAS ANTI-MÍLDIO HOMOLOGADOS PARA A VINHA EM P.I.**CONTACTO**

SUBSTÂNCIAS ACTIVAS	DOSES/ha	I.S.	OBSERVAÇÕES
cobre (hidróxido)	200 - 300 g	1 semana	Fitotoxidade com frio e humidade
cobre (oxicloreto)	300 - 600 g	1 semana	
cobre (óxido cuproso)	270 g	1 semana	
cobre (sulfato de Cu e Ca)- mistura bordalesa	1 - 2 kg	1 semana	Fitotoxidade com frio e humidade
cobre (sulfato de Cu e Ca)+ mancozebe	300 g	8 semanas	
cobre (sulfato de Cu tribásico)		1 semana	
folpete	200 - 300 g	6 semanas	Ação complementar contra botrytis e escoriose
mancozebe	270 g	8 semanas	Ação complementar contra escoriose
metirame	200 g	8 semanas	ação complementar contra botrytis
propinebe	250 g	8 semanas	

PENETRANTES + CONTACTO

SUBSTÂNCIAS ACTIVAS	DOSES/ha	I.S.	OBSERVAÇÕES
azoxistrobina	100 ml	3 semanas	mildio+oídio (3 tratamentos em bloco)
azoxistrobina + folpete	150 ml	3 semanas	mildio+oídio (3 tratamentos em bloco)
bentiavalicarbe + mancozebe	180-200 g	8 semanas	
clazofamida	400 ml	3 semanas	
cimoxanil + oxicloreto de cobre	300 g	3 semanas	
cimoxanil + hidróxido de cobre			
cimoxanil+sulfato de cobre e cálcio	400 g	3 semanas	
cimoxanil+sulfato de cobre+mancozebe	300 g	8 semanas	
cimoxanil+oxicloreto de cobre+propinebe	250 g	9 semanas	
cimoxanil + fomoxadona	40 g	3 semanas	
cimoxanil + fomoxadona + folpete	150 g	8 semanas	
cimoxanil + folpete	200 g	6 semanas	Complementar escoriose, botrytis, oídio
cimoxanil + folpete + mancozebe	400 g	8 semanas	
cimoxanil + folpete + mancozebe + tebuconazol	250 g	6 semanas	Ação mildio + oídio
cimoxanil + mancozebe	300 g	8 semanas	
cimoxanil + metirame	200 g	1 semana	Complementar botrytis

cimoxanil + propinebe	250-300 g	8 semanas	
cimoxanil + propinebe + tebuconazol	250 g	8 semanas	Acção míldio + oídio
oxicloreto de cobre + iprovalicarbe	150 g	4 semanas	
dimetomorfe + folpete	135 - 160 g	8 semanas	
dimetomorfe + mancozebe	200 - 240 g	8 semanas	Acção anti-esporulante
dimetomorfe + oxicloreto de cobre	250 - 300 g	3 semanas	Acção anti-esporulante
oxicloreto de cobre + mandipropamida	400 - 500 g	3 semanas	
folpete + iprovalicarbe	130 g	6 semanas	Acção anti-esporulante
folpete + mandipropamida	200-250 g	6 semanas	
folpete + piraclostrobina	200 ml	8 semanas	
mancozebe + zoxamida	150-180 g	8 semanas	
metirame + piraclostrobina	150 g	3 semanas	
piraclostrobina	20 - 30 g	5 semanas	

SISTÉMICOS

SUBSTÂNCIAS ACTIVAS	DOSES/hl	I.S.	OBSERVAÇÕES
benalaxil + folpete	200-250 g	8 semanas	Anti-esporulante
benalaxil + mancozebe	200-250 g	8 semanas	Anti-esporulante
benalaxil M + folpete	200 g	6 semanas	
benalaxil M + mancozebe	200-250 g	8 semanas	Anti-esporulante
cimoxanil + folpete + fosetil de alumínio	400 g	6 semanas	Complementar sobre oídio e botrytis
cimoxanil + folpete + metalaxil	250 g	6 semanas	
cimoxanil + fosetil de alumínio + mancozebe	400 g	8 semanas	
oxicloreto de cobre + metalaxil	400 g	3 semanas	
fluopicolida + fosetil de alumínio	250 g	4 semanas	
fenamidona + fosetil de alumínio		4 semanas	
folpete + fosetil de alumínio	300 g	6 semanas	Sistemia ascendente e descendente. A. escoriose
folpete + fosetil de alumínio + iprovalicarbe	400 g	6 semanas	Sistemia asc. e desc. A. Escoriose. Anti-esporulante
folpete + metalaxil	200 g	6 semanas	Anti-esporulante. Acção escoriose e botrytis
folpete + metalaxil M	200 g	6 semanas	
fosetil de alumínio + mancozebe	400 g	8 semanas	Sistemia asc. e desc. Acção sobre escoriose
mancozebe + metalaxil	250 g	8 semanas	
mancozebe + metalaxil M	250 g	8 semanas	Anti-esporulante