

Estação de Avisos do Douro

Circular nº: 04 / 2013

Régua, 24 de abril de 2013

ENXOFRE AO PÂMPANO

Aconselhamos os Srs. Viticultores a efectuarem uma aplicação de enxofre quando as videiras apresentarem pâmpanos com cerca de 20 a 30 cm.

Este tratamento destina-se a proteger a videira contra o oídio e outras doenças, bem como, aproveitando o efeito repulsivo do enxofre, prevenir o aparecimento de algumas pragas.

Importante:

- ✓ Recomendamos que não sejam aplicadas doses excessivas de enxofre. Nesta fase, a dose de referência é de 20 a 25 kg/ha de enxofre em pó e de 8 a 10 kg/ha de enxofre molhável.
- ✓ O enxofre em pó deverá ser aplicado com **polvilhador** ou **torpilha**, para que o produto fique depositado sob a forma de uma fina camada à **superfície das folhas da videira**, evitando a escorrência para o solo. As aplicações de enxofre em pó devem ser realizadas com a folhagem seca para evitar problemas de fitotoxicidade (queima).

Atenção Sr. Viticultor:

O enxofre em pó deve ser aplicado com **polvilhador** ou **torpilha**. A utilização do “saco” para aplicar enxofre conduz a um gasto exagerado de produto que é prejudicial para o solo (aumento da acidez), para o ambiente e para a “bolsa” do agricultor.

Evite o desperdício! Não aplique enxofre com “saco”!

O Responsável pela Estação de Avisos do Douro,



José Rodrigues de Freitas
(Engenheiro Agrónomo)