

# AVISOS AGRÍCOLAS

## ESTAÇÃO DE AVISOS DO DOURO

### CIGARRINHA DA FLAVESCÊNCIA DOURADA (*Scaphoideus titanus*)

De acordo com a **Portaria nº 165/2013** publicada no Diário da República nº 81, 1ª Série, de 26/04/2013, é **obrigatória a luta contra este cicadélideo**.

Assim, o terceiro tratamento é obrigatório nas freguesias de Sanfins do Douro, Vila Chã, Vilar de Maçada, Vila Verde e União das freguesias de Pópulo e Ribalonga, do concelho de Alijó; São Lourenço de Ribapinhão e Souto Maior, do concelho de Sabrosa; Cumieira, Medrões; Sever e União das freguesias de Lobrigos (São Miguel e São João Batista) e Sanhoane, do concelho de Santa Marta de Penaguião, devem efetuar o terceiro tratamento, no período de 17 a 27 de agosto (atenção ao intervalo de segurança do inseticida). Nas vinhas em que a vindima seja feita mais cedo (em agosto/início de setembro), o tratamento poderá ser adiado e realizado logo a seguir à vindima.

Os inseticidas homologados para a cultura da Vinha, devem ser consultados no site da DGAV: **SIFITO - Sistema de Gestão das Autorizações de Produtos Fitofarmacêuticos** - (<https://sifito.dgav.pt/>).

Deverá ser guardado um registo da data da realização do tratamento, do produto utilizado e da dose aplicada, para efeitos de futuro controlo.




Videira com sintomas de Flavescência Dourada

### TRAÇA DA UVA

Já terá atingido o pico do terceiro voo, que dará origem às lagartas da terceira geração da praga. Sendo esta geração a principal causa de muitas podridões que se verificam na vindima, aconselhamos os Srs. Viticultores a efetuar a estimativa do risco nas várias parcelas de vinha, através da observação visual de posturas e perfurações.

Lembramos que o Nível Económico de Ataque é de 1 a 10 % de cachos atacados (ovos e/ou perfurações), observando em cada parcela dois cachos por videira em 50 videiras escolhidas ao acaso.

Caso necessário, deverá ser efetuado um tratamento dirigido aos cachos com um inseticida cujo intervalo de segurança permita a realização da vindima na data prevista.



## CIGARRINHA VERDE

Recomenda-se a vigilância das vinhas, principalmente em vinha com historial desta praga.

Relembramos, que nesta fase, o Nível Económico de Ataque é de 50 ninfas por 100 folhas observadas ao acaso (duas folhas por videira).



Ninfas de Cigarrinha.



## ESCA DA VIDEIRA

Ao longo deste Verão têm-se observado, sintomas característicos desta doença do lenho: as folhas adquirem cloroses, seguidas de necroses entre as nervuras principais, os lançamentos definham, as varas podem não atemper e os cachos murcham ou secam. Estes sintomas podem ocorrer em toda a planta ou em apenas alguns dos seus órgãos.

Assim, aconselhamos os Srs. Viticultores a **marcarem as videiras afetadas por esta doença**, por forma a poderem proceder a medidas preventivas e de recuperação das plantas na altura da poda de Inverno.



Sintomas de Esca.