

## FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE A PODRIDÃO NEGRA (BLACK ROT)

Substância (s) Activa (s)	Proteção		P. (dias)	I.S. (dias)	Form.	Nome comercial (Empresa)
	Míldio	Oídio				
azoxistrobina	sim	sim	10 a 12	21	SC	Quadris (SYNGENTA)
					WG	Quadris G (SYNGENTA)
azoxistrobina+folpete	sim	sim	10 a 12	42**	SC	Quadris Max (SYNGENTA) Siena (ADAMA) Tagus F (Selectis) Trunfo F (SAPEC)
bentiavalicarbe+mancozebe	sim	não	10 a 12	56*	WG	Valbon (SIPCAM PORTUGAL)
cresoxime-metilo+Penconazol	não	sim	12 a 14	35	WG	Arriosta (SELECTIS) Ksar Vitis (SAPEC)
difenoconazol	não	sim	12 a 14	21	EC	Mavita 250 EC (ADAMA) Score 250 EC (SYNGENTA) Zanol (AGROTOTAL)
dimetomorfe+mancozebe	sim	não	10 a 12	28	WG	Acrobat M DG (BASF)
ditianão+fosfonatos de potássio	sim	não	10 a 14	42	SC	Envita (BASF)
fenebuconazol	não	sim	12 a 14	28	EW	Impala (IQV AGRO)
folpete+piraclostrobina	sim	não	10 a 12	42**	EC	Cabrio Star (BASF)
fluopicolida + propinebe	sim	não	10 a 12	56	WG	Pasadoble (BAYER)
mancozebe	sim	não	8 a 12	28	WG	Dithane Neotec (LUSOSEM) Manzene WG (AGROTOTAL) Nufozebe 75 DG (NUFARM) Vondozeb GD (EPAGRO)
					WP	Dithane M45 (LUSOSEM) Mancozan (BAYER) Mancozeb 80 Vallés (IQV AGRO) Mancozebe Selectis (SELECTIS) Manzate (NUFARM) Nufosebe 80 (NUFARM) Unizeb (GENYEN) Vondozeb-D 80PM (EPAGRO)
mancozebe+metalaxil-M	sim	não	12 a 14	56*	WG	Ridomil Gold MZ Pépité (SYNGENTA) Mildisan MZ (LUSOSEM)
metirame+piraclostrobina	sim	sim	12 a 14	56**	WG	Cabrio Top (BASF)
miclobutanil	não	sim	12 a 14	14	EW	Licorne (SIPCAM PORTUGAL) Misha 20 EW (SHARDA e NUFARM) Rally Plus (IQV AGRO) Systhane Ecozome (LUSOSEM)
tebuconazol	não	sim	12 a 14	14	SC	Ulysses (JOVAGRO)
tebuconazol+trifloxistrobina	não	sim	12 a 14	35	WG	Flint Max (BAYER)
trifloxistrobina	não	sim	14	35	WG	Flint (BAYER)

### LEGENDA

#### Proteção:

**Míldio** - protege simultaneamente contra o míldio

**Oídio** - protege simultaneamente contra o oídio

#### Persistência (P):

persistência de acção dos tratamentos  
Os períodos mais curtos referem-se à fase de crescimento activo da videira

#### Intervalo de Segurança (I.S.):

(\*) - O I.S. indicado é válido em uvas para vinificação (Em uvas de mesa o I.S. é metade dos dias indicados).

(\*\*) - Não aplicar em videiras de uvas de mesa.

#### Formulação (Form.):

**DC** - concentrado dispersível;

**EC** - concentrado para emulsão;

**EW** - emulsão óleo em água;

**SC** - suspensão concentrada;

**WG** - grânulos dispersíveis em água;

**ATENÇÃO:** Antes de aplicar um produto fitofarmacêutico leia atentamente o rótulo