

Estação de Avisos do Douro

Circular nº 05/2010

Régua, 26 de Maio de 2010

OÍDIO ATENÇÃO!

A maior parte das vinhas da Região encontra-se em floração, pelo que, aconselhamos uma aplicação de **enxofre em pó**, na dose de 50 kg/ha.

A enxofra deverá ser efectuada fora das horas de maior calor e com a folhagem seca.

Caso seja necessário efectuar um tratamento anti-míldio ou a temperatura suba para valores superiores a 30°C, então, deverá ser seguida a seguinte estratégia:

- Em vinhas que ainda não atingiram a floração/alimpa, aconselhamos a aplicação de fungicidas anti-oídio sistémicos do grupo dos IBE's.
- Em vinhas que ultrapassaram já a fase de vingamento, aconselhamos a utilização de fungicidas anti-oídio penetrantes ou da mistura boscalide+cresoxime-metilo (sistémico).

(Consultar a lista enviada com a Circular 04/2010)

MÍLDIO

A precipitação registada ontem em **Armamar, Sabrosa (Celeirós), Favaios, Alijó e Murça (Porrais)** proporcionou condições para a ocorrência de novas infecções primárias. Assim, as vinhas situadas nas proximidades destas localidades que se encontravam desprotegidas deverão ser tratadas durante a próxima semana. Deverá ser usado um fungicida anti-míldio sistémico ou penetrante, juntamente com um produto anti-oídio.

Nos restantes locais da Região, por agora, não é necessário realizar qualquer tratamento contra esta doença.

TRACA DA UVA

Nesta geração, o nível económico de ataque (NEA) é de 100 a 200 ninhos por 100 cachos, pelo que, de uma forma geral, consideramos que não é necessário efectuar tratamento.


Lista de fungicidas homologados contra o míldio correcção!

À Lista enviada com a Circular n.º 03/10, no grupo dos Fungicidas Penetrantes, deverá ser acrescentado o produto **VALBON**, comercializado pela empresa **Sipcam/Quimagro**. Trata-se de uma mistura das substâncias activas bentiavalicarbe + mancozebe, que possui actividade preventiva, curativa e anti-esporulante e persistência de acção de 10 a 12 dias. É permitida a sua utilização em **Protecção Integrada** (máx. 2 aplicações). A Classificação Toxicológica é Xn; N, as frases de risco que lhe estão associadas são R40-43-63; R50/53 e o Intervalo de Segurança é de 56 dias (em uvas para vinificação).

Atenção Sr. Viticultor:

Decorre durante o presente mês de Maio o primeiro período de **recolha de embalagens vazias** de produtos fitofarmacêuticos. Informe-se junto do seu fornecedor e **cumpra as normas das boas práticas agrícolas e ambientais.**

O Responsável pela Estação de Avisos do Douro



José Rodrigues de Freitas
(Engenheiro Agrónomo)