

## Estação de Avisos do Douro

Circular n.º: 05 / 2014

Régua, 8 de maio de 2014

### MÍLDIO ATENÇÃO!

Na sub-região do **Baixo Corgo** são muitas as vinhas com fortes ataques de míldio nas folhas e nos cachos. As condições ambientais têm sido favoráveis ao desenvolvimento da doença (orvalhadas), pelo que a eficácia dos tratamentos não ultrapassa os 8 a 10 dias.

Assim, aconselhamos o seguinte:

- ✓ Nas vinhas onde existem infecções de míldio **renovar o tratamento ao fim do 8º dia, usando um fungicida que possua acção curativa** (ver Lista enviada com a Circular N.º 4);
- ✓ As vinhas que foram oportunamente tratadas e em que não há manchas de míldio recentes ou cachos atacados, não necessitam, para já, de novo tratamento.

### OÍDIO ATENÇÃO!

As condições são também muito favoráveis ao oídio, verificando-se já ataques em muitas vinhas.

Assim, nas vinhas que vão ser tratadas contra o míldio, aconselhamos que seja adicionado à calda um **fungicida anti-oídio**. Nesta fase deverá ser dada preferência aos **fungicidas do grupo dos IBE's** (ver Lista enviada com a Circular N.º 4)

Nas vinhas que se encontrem em floração/alimpa, e em que não seja necessário efectuar tratamento anti-míldio, aconselhamos a realização de uma **enxofra em pó**.

### Nota importante

Para contrariar o desenvolvimento das doenças e aumentar a eficácia dos tratamentos é muito importante que a despampa esteja realizada e que a vegetação seja correctamente orientada.

A desponta deverá ser ligeira e atrasada o mais possível para não estimular a emissão de netas.

Estas operações culturais promovem o arejamento do interior da sebe e facilitam a penetração da calda fungicida.

O Responsável pela Estação de Avisos do Douro,



**José Rodrigues de Freitas**  
(Engenheiro Agrónomo)